



Dr POISSONNIER COSTARD - Aix en Provence

APRÈS UNE INTERVENTION DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, OPTIMISER MON RÉSULTAT CICATRICIEL

Livret d'informations

*Cicatriser avec vous, pour vous.

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*



Tout simplement plus belle…

La chirurgie esthétique permet de remodeler ou embellir son corps pour se sentir plus belle, plus sereine, confiante en soi-même.

Pour profiter pleinement de ses bienfaits, avoir une cicatrice discrète est le vœu de chacun.

LA CICATRISATION : UN PROCESSUS LONG

La cicatrisation d'une plaie chirurgicale se déroule principalement en 3 phases.

1 La première phase débute juste après l'intervention et dure environ 15 jours. Les cellules de la peau se multiplient et synthétisent les composants du derme (fibres de collagène et d'élastine notamment) pour refermer la plaie. La cicatrice est généralement belle et fine.

2 Ensuite, au cours des premiers mois post-opératoires, la cicatrice va évoluer, signe d'un remodelage en profondeur. La cicatrice devient plus rouge, dure, boursouflée et des démangeaisons sont fréquentes. Ce stade dure en moyenne 3 à 6 mois.

3 La cicatrice rentre ensuite dans sa dernière phase où elle commence à blanchir et à s'assouplir.

Au terme de ce processus plus ou moins long, qui peut durer jusqu'à 2 ans, la cicatrice prendra son aspect final : plus blanche, souple et insensible.

URGOTOUCH

Design your scar*

METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ POUR OBTENIR UNE BELLE CICATRICE

LA CICATRISATION : UN PROCESSUS ALÉATOIRE

Afin de refermer rapidement la plaie après une incision, les cellules cutanées se multiplient et synthétisent les éléments qui les entourent, tels que le collagène ou l'élastine.
La qualité de l'organisation de ces fibres de collagène est essentielle à l'obtention d'une belle cicatrice mais très variable d'une personne à l'autre, ce qui rend le résultat cicatriciel imprévisible, aléatoire et dépendant de chaque personne.



AGIR AU PLUS VITE POUR AMÉLIORER LE RÉSULTAT CICATRICIEL

Votre chirurgien utilise une nouvelle technologie laser, unique, dans le but d'agir sur la quantité et l'organisation des fibres de collagène au stade le plus précoce de la cicatrisation, juste après la suture.
Réalisé sous anesthésie, à la fin de l'intervention chirurgicale, cet acte est totalement indolore. Développé par Urgo Medical, laboratoire français spécialiste de la cicatrisation, UrgoTouch a fait l'objet d'une étude clinique qui a démontré son efficacité et sa sécurité.

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE D'OPTIMISATION CICATRICIELLE

UrgoTouch est le seul laser portatif au monde conçu pour le traitement préventif des cicatrices en un geste simple, sécurisé et indolore pour vous. Votre chirurgien est équipé de cette technologie innovante pour mettre toutes les chances de votre côté.

La cicatrisation reste un phénomène aléatoire dont la qualité ne peut en aucun cas être garantie. Votre chirurgien, qualifié et spécifiquement formé à ce type d'intervention, utilisera les **meilleures techniques chirurgicales et technologies** pour vous permettre d'**optimiser le résultat cicatriciel** mais ceci ne supprimera pas cet aspect aléatoire et ne garantira pas un résultat invisible.

*Designez votre cicatrice

PRENDRE SOIN DE VOTRE CICATRICE

Durant toute son évolution, il est important de prendre soin de votre cicatrice **pour qu'elle devienne la plus discrète possible**.



LES PREMIÈRES SEMAINES, VOTRE CICATRICE EST ENCORE FRAGILE

- Évitez les mouvements trop amples qui peuvent provoquer une tension de la cicatrice. Votre chirurgien pourra vous prescrire des sous-vêtements adaptés, permettant un bon maintien cutané.
- Vous pourrez rapidement prendre une douche mais veillez à bien sécher la peau autour de la cicatrice.
- Ne vous baignez qu'après 6 semaines (baignoire, piscine, mer) ou après accord de votre chirurgien.

UNE FOIS LA CICATRICE FERMÉE APRÈS QUELQUES SEMAINES

- Hydratez avec une crème et massez la cicatrice quotidiennement.
- Protégez la cicatrice de l'exposition solaire pendant 6 mois minimum à l'aide de vêtements ou de crème protectrice (écran total type SPF 50).

TABAC

Le tabac augmente le risque de complication et ralentit la cicatrisation.

Si vous fumez, il est important que vous cessiez toute consommation de cigarettes au moins 6 à 8 semaines avant l'intervention et dans les semaines qui suivent.

URGOTOUCH® SYSTÈME LASER : PIÈCE À MAIN (LASER 1210 NM). BANDELETTE DE SÉCURITÉ. MANCHON. - TRAITEMENT DES CICATRICES CHIRURGICALES, EN VUE D'AMÉLIORER LE RÉSULTAT CICATRICIEL. URGOTOUCH® SYSTÈME LASER EST UN DISPOSITIF MÉDICAL, PRODUIT DE SANTÉ RÉGLEMENTÉ QUI PORTE À CE TITRE LE MARQUAGE CE. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE CHIRURGIEN.

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

Création graphique EFFISCIENCE - 09/2016 - Fabricant : Laboratoires URGO - Crédits photos : Getty Images. *Cicatriser avec vous, pour vous.